

FAD NOW 5.0

DEEP BLUE

**Dal profondo della trombosi venosa
all'emergenza dell'embolia**

Responsabile scientifico

Andrea Fontanella

Direttore di Dipartimento di Medicina
Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli
Presidente nazionale FADOI

NOW 5.0 | DEEP BLUE

Responsabile scientifico: Andrea Fontanella

PIANO EDITORIALE

- **Embolia ribelle.** Maurilio Cirrito
- **TVP/EP trattamenti: miti da sfatare in un mondo reale da affrontare.** Luigi Gianturco
- **Utilità e sicurezza della Terapia Anticoagulante Orale nel Tromboembolismo Venoso.** Pierpaolo Di Micco
- **La quotidiana complessità nella scelta dell'anticoagulante.** Matteo Mazzetti
- **Un caso di TVP in PS.** Riccardo Di Sciacca

Destinatari: Medici-Chirurghi (MMG e specialisti in angiologia, cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, continuità assistenziale, ematologia, geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna, neurologia, ortopedia e traumatologia) e Farmacisti.

Per accedere al corso: Apri una pagina del browser all'indirizzo **ecm.medmaps.it**

Per iscriverti al corso ECM accedi al **CATALOGO**, seleziona il corso **NOW 5.0 DEEP BLUE**, accedi alla sua scheda e clicca su **ISCRIVITI**.

Se sei già registrato sul portale **medmaps.it** dovrai effettuare soltanto il log-in inserendo email e password.

Se non sei già iscritto alla piattaforma, dovrai effettuare – soltanto al primo accesso – la registrazione completa inserendo i tuoi dati personali.



La tromboembolia venosa è il processo patologico costituito dalla trombosi venosa profonda (TVP) e dalla sua più temibile complicanza, l'embolia polmonare (EP). Si tratta di una causa importante di morbidità e mortalità: è la terza più comune patologia cardiovascolare dopo l'infarto del miocardio e l'ictus ischemico, con una incidenza per la TVP di 150/100.000 casi all'anno, che sale a 5-25/1.000 nella fascia d'età 70-80 anni, e per la complicanza embolica polmonare di 60-70/100.000 casi all'anno. La trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare sono condizioni potenzialmente gravi e anche letali: la mortalità a 30 giorni è dell'ordine del 6% circa nei pazienti con TVP e del 12% circa nei pazienti con EP.

Negli ultimi anni l'interesse verso questa patologia è cresciuto ulteriormente grazie all'introduzione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO), che ha cambiato radicalmente la gestione del paziente tromboembolico, dall'approccio diagnostico alla fase ospedaliera e domiciliare fino al successivo follow up. I NAO rappresentano dunque una nuova arma per il trattamento delle malattie tromboemboliche, in grado di offrire a medici e pazienti un miglioramento in termini di efficacia, di tollerabilità e di maneggevolezza rispetto alle terapie tradizionali.

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

Durata: dal 1 luglio 2018 al 31 gennaio 2019

9 crediti ECM

FAD NOW 5.0



REVERSO Andrea Di Lenarda, Maria Pia Ruggieri

La terapia anticoagulante orale in emergenza urgenza



DEEP BLUE Andrea Fontanella

Dal profondo della trombosi venosa all'emergenza dell'embolia



IN MY HEART Claudio Fresco, Andrea Rubboli

Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?



HEART&BLUES Massimo Grimaldi

Cardioversione e ablazione di fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso



IN MY MIND Roberta Rossini, Danilo Toni

Esperienze dalla pratica clinica nella gestione delle diverse forme di ictus

medstage
publishing, education, medical communication & events

Helpline Med Stage

da lunedì a venerdì, ore 9.00-18.00

tel: 0363 1902699 - email: fad@medstage.it

Realizzato con il contributo non condizionante di



**Boehringer
Ingelheim**