

FAD NOW 5.0

HEART&BLUES

**Cardioversione e ablazione di fibrillazione
atriale: istruzioni per l'uso**

Responsabile scientifico

Massimo Grimaldi

Responsabile Unità di Aritmologia
Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA)

NOW 5.0 | HEART&BLUES

Responsabile scientifico: Massimo Grimaldi

PIANO EDITORIALE

- **Fibrillazione atriale:**

Epidemiologia, Fisiopatologia e aritmogenesi

Soggetti a rischio di fibrillazione atriale

Diagnosi e classificazione dell'aritmia

Rischio tromboembolico e terapia anticoagulante orale

Terapia farmacologica antiaritmica. Controllo del ritmo e della frequenza cardiaca

Cardioversione farmacologica ed elettrica

Ablazione del substrato aritmico

Antonio Di Monaco

- **Istruzioni per l'uso: un caso complesso di cardioversione elettrica di fibrillazione atriale.** Massimo Grimaldi

- **Ablazione transcatetere di fibrillazione atriale con dabigatran non interrotto.** (Video) Massimo Grimaldi

Per accedere al corso: Apri una pagina del browser all'indirizzo **ecm.medmaps.it**

Per iscriverti al corso ECM accedi al **CATALOGO**, seleziona il corso **NOW 5.0 HEART&BLUES**, accedi alla sua scheda e clicca su **ISCRIVITI**.

Se sei già registrato sul portale **medmaps.it** dovrai effettuare soltanto il log-in inserendo email e password.

Se non sei già iscritto alla piattaforma, dovrai effettuare – soltanto al primo accesso – la registrazione completa inserendo i tuoi dati personali.



Destinatari: Medici-Chirurghi (MMG e specialisti in angiologia, cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, continuità assistenziale, ematologia, geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna, neurologia, ortopedia e traumatologia) e Farmacisti.

RAZIONALE

La fibrillazione atriale è una delle cause più frequenti di stroke, spesso invalidanti, di scompenso cardiaco e rappresenta la prima causa di ricovero ospedaliero per aritmie. La sua prevalenza in Italia è del 1,5% nella popolazione adulta. La etiopatogenesi della fibrillazione atriale è estremamente variabile e spesso rimane di natura non determinata. Dal punto di vista elettrofisiologico l'attivazione elettrica degli atri risulta prevalentemente caotica ed estremamente rapida. L'attivazione elettrica disordinata ed eccessivamente rapida comporta la perdita della efficienza meccanica. La conseguente stasi ematica, soprattutto nell'auricola sinistra, favorisce la formazione di trombi ed aumenta il rischio di complicanze tromboemboliche.

Questa FAD verrà strutturata illustrando i meccanismi patogenetici della fibrillazione atriale e le ultime strategie diagnostico/terapeutiche. In particolare saranno prese in esame la cardioversione elettrica e l'ablazione transcateretere, focalizzando altresì l'attenzione sulla gestione degli anticoagulanti orali prima, durante e dopo queste procedure.

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

Durata: dal 1 Novembre 2018 al 31 gennaio 2019

9 crediti ECM

FAD NOW 5.0



REVERSO Andrea Di Lenarda, Maria Pia Ruggieri

La terapia anticoagulante orale in emergenza urgenza



DEEP BLUE Andrea Fontanella

Dal profondo della trombosi venosa all'emergenza dell'embolia



IN MY HEART Claudio Fresco, Andrea Rubboli

Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?



HEART&BLUES Massimo Grimaldi

Cardioversione e ablazione di fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso



IN MY MIND Roberta Rossini, Danilo Toni

Esperienze dalla pratica clinica nella gestione delle diverse forme di ictus

med stage
publishing, education, medical communication & events

Helpline Med Stage

da lunedì a venerdì, ore 9.00-18.00

tel: 0363 1902699 - email: fad@medstage.it

Realizzato con il contributo non condizionante di



**Boehringer
Ingelheim**