

FAD NOW 5.0

IN MY HEART



ATBV

Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?

Responsabili scientifici

Claudio Fresco

Responsabile Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche
Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine

Andrea Rubboli

UO di Cardiologia
Laboratorio di Emodinamica
Ospedale Maggiore di Bologna

NOW 5.0 IN MY HEART

Responsabili scientifici: Claudio Fresco; Andrea Rubboli

PIANO EDITORIALE

- **Epidemiologia dell'associazione fra fibrillazione atriale e sindromi coronariche acute.** Claudio Cuccia
- **The Dual Pathway Hypothesis: gli studi che supportano il nuovo paradigma di trattamento.** Claudio Fresco
- **I rischi di una terapia combinata con farmaci antitrombotici**
Maddalena Lettino
- **L'implementazione dei risultati degli studi nelle Linee guida e nella pratica clinica.** Andrea Rubboli

Destinatari: Medici-Chirurghi (MMG e specialisti in angiologia, cardiocirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, continuità assistenziale, ematologia, geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna, neurologia, ortopedia e traumatologia) e Farmacisti.

Per accedere al corso: Apri una pagina del browser all'indirizzo **ecm.medmaps.it**

Per iscriverti al corso ECM accedi al **CATALOGO**, seleziona il corso **NOW 5.0 IN MY HEART**, accedi alla sua scheda e clicca su **ISCRIVITI**.

Se sei già registrato sul portale **medmaps.it** dovrai effettuare soltanto il log-in inserendo email e password.

Se non sei già iscritto alla piattaforma, dovrai effettuare – soltanto al primo accesso – la registrazione completa inserendo i tuoi dati personali.



La fibrillazione atriale rappresenta l'aritmia più frequente nelle società occidentali. Si stima che circa il 2% della popolazione italiana sia affetta da fibrillazione atriale. L'invecchiamento progressivo della popolazione fa inoltre stimare che questo numero sia destinato a crescere ulteriormente nel futuro.

Anche la cardiopatia ischemica è una patologia ad alta prevalenza, che diventa sempre più alta man mano che l'età aumenta. Il cardine del trattamento degli eventi acuti è diventato il trattamento interventistico, che nella quasi totalità dei casi comprende l'impianto di uno o più stent coronarici, con la conseguente necessità di una protratta duplice antiaggregazione. Fino a pochi anni fa questi pazienti venivano sottoposti alla cosiddetta "triplice terapia" che comprendeva warfarin, aspirina e clopidogrel. Questo trattamento, utilizzato in tutto il mondo, ha il suo tallone d'Achille nell'alto rischio di complicanze emorragiche. Per ovviare questo problema ci si è posti la domanda se l'utilizzo di uno dei nuovi anticoagulanti, che notoriamente hanno un profilo di sicurezza e di efficacia decisamente migliore del warfarin, potesse sostituire il vecchio anticoagulante permettendo inoltre di togliere uno degli antiaggreganti dal cocktail antitrombotico.

Lo studio Re-Dual PCI, con i suoi favorevolissimi risultati, rappresenta la risposta a questa domanda. Tuttavia la sua implementazione non è facile ed è francamente un peccato che i benefici associati a questo innovativo approccio al trattamento antitrombotico non vengano trasferiti alla popolazione. Obiettivo della FAD è diffondere in modo sistematico l'epidemiologia dell'associazione tra fibrillazione atriale e sindromi coronariche acute; approfondire la farmacologia dei farmaci antitrombotici; diffondere i risultati degli studi che supportano il nuovo paradigma di trattamento di questi pazienti; confrontare i risultati degli studi con quanto attualmente indicato nelle vigenti Linee Guida.

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

Durata: dal 1° febbraio al 31 dicembre 2019

9 crediti ECM

FAD NOW 5.0



REVERSO Andrea Di Lenarda, Maria Pia Ruggieri

La terapia anticoagulante orale in emergenza urgenza



DEEP BLUE Andrea Fontanella

Dal profondo della trombosi venosa all'emergenza dell'embolia



IN MY HEART Claudio Fresco, Andrea Rubboli

Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?



HEART&BLUES Massimo Grimaldi

Cardioversione e ablazione di fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso



IN MY MIND Roberta Rossini, Danilo Toni

Esperienze dalla pratica clinica nella gestione delle diverse forme di ictus

Con Egida di: ATBV

(Aterosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare)



ATBV

medstage
publishing, education, medical communication & events

Helpline Med Stage

da lunedì a venerdì, ore 9.00-18.00

tel: 0363 1902699 - email: fad@medstage.it

Realizzato con il contributo non condizionante di



**Boehringer
Ingelheim**