FAD

NOW 5.0

HEART&BLUES

Cardioversione e ablazione di fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso

Responsabile scientifico

Massimo Grimaldi
Responsabile Unità di Aritmologia
Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA)

NOW 5.0 | HEART&BLUES

Responsabile scientifico: Massimo Grimaldi

PIANO EDITORIALE

- **Fibrillazione atriale:**
  - Epidemiologia, Fisiopatologia e aritmogenesi
  - Soggetti a rischio di fibrillazione atriale
  - Diagnosi e classificazione dell'aritmia
  - Rischio tromboembolico e terapia anticoagulante orale
  - Terapia farmacologica antiaritmica. Controllo del ritmo e della frequenza cardiaca
  - Cardioversione farmacologica ed elettrica
  - Ablazione del substrato aritmico

  Antonio Di Monaco
- **Istruzioni per l'uso: un caso complesso di cardioversione elettrica di fibrillazione atriale.** Massimo Grimaldi
- **Ablazione transcatetere di fibrillazione atriale con dabigatran non interrotto.** (Video) Massimo Grimaldi

Per accedere al corso: Apri una pagina del browser all'indirizzo **ecm.medmaps.it**

Per iscriverti al corso ECM accedi al **CATALOGO**, seleziona il corso **NOW 5.0 HEART&BLUES**, accedi alla sua scheda e clicca su **ISCRIVITI**.

Se sei già registrato sul portale **medmaps.it** dovrai effettuare soltanto il log-in inserendo email e password.

Se non sei già iscritto alla piattaforma, dovrai effettuare – soltanto al primo accesso – la registrazione completa inserendo i tuoi dati personali.

Destinatari: Medici-Chirurghi (MMG e specialisti in angiologia, cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, continuità assistenziale, ematologia, geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, medicina interna, neurologia, ortopedia e traumatologia) e Farmacisti.

RAZIONALE

La fibrillazione atriale è una delle cause più frequenti di stroke, spesso invalidanti, di scompenso cardiaco e rappresenta la prima causa di ricovero ospedaliero per aritmie. La sua prevalenza in Italia è del 1,5% nella popolazione adulta. La etiopatogenesi della fibrillazione atriale è estremamente variabile e spesso rimane di natura non determinata. Dal punto di vista elettrofisiologico l'attivazione elettrica degli atri risulta prevalentemente caotica ed estremamente rapida. L'attivazione elettrica disordinata ed eccessivamente rapida comporta la perdita della efficienza meccanica. La conseguente stasi ematica, soprattutto nell'auricola sinistra, favorisce la formazione di trombi ed aumenta il rischio di complicanze tromboemboliche.
Questa FAD verrà strutturata illustrando i meccanismi patogenetici della fibrillazione atriale e le ultime strategie diagnostico/terapeutiche. In particolare saranno prese in esame la cardioversione elettrica e l'ablazione transcatetere, focalizzando altresì l'attenzione sulla gestione degli anticoagulanti orali prima, durante e dopo queste procedure.

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
Durata: **dal 1° febbraio al 31 dicembre 2019**
9 crediti ECM

FAD NOW 5.0

REVERSO **Andrea Di Lenarda, Maria Pia Ruggieri**
La terapia anticoagulante orale in emergenza urgenza

DEEP BLUE **Andrea Fontanella**
Dal profondo della trombosi venosa all'emergenza dell'embolia

IN MY HEART **Claudio Fresco, Andrea Rubboli**
Il trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale che devono sottoporsi a PCI: un cambio di paradigma?

HEART&BLUES **Massimo Grimaldi**
Cardioversione e ablazione di fibrillazione atriale: istruzioni per l'uso

IN MY MIND **Roberta Rossini, Danilo Toni**
Esperienze dalla pratica clinica nella gestione delle diverse forme di ictus

med stage
publishing, education, medical communication & events

Helpline Med Stage
da lunedì a venerdì, ore 9.00-18.00
tel: 0363 1902699 - email: fad@medstage.it

Realizzato con il contributo non condizionante di

Boehringer Ingelheim

Codice BI 51005634